

Sarcina

Alcoolul trebuie evitat in perioada sarcinii – chiar si in cantitati mici

Femeile insarcinate trebuie fie sa nu consume alcool, fie sa consulte medicul inainte de a face acest lucru, intrucat in prezent nu exista un consens cu privire la ce cantitate de alcool poate fi consumata de o femeie insarcinata fara a afecta fatul.

In momentul in care o femeie consuma alcool in timpul sarcinii, acesta este transportat prin sistemul circulator, prin placenta si in sangele fetal.

Aceasta poate afecta dezvoltarea fatului si poate cauza Spectrul Tulburarilor Alcoolice Fetale (STAF). STAF se refera la o gama larga de malformatii congenitale, cum ar fi Sindromul Alcoolic Fetal (SAF).

In prezent nu exista un consens cu privire la ce cantitate de alcool poate fi consumata de o femeie insarcinata

Cei care sufera de SAF pot avea malformatii faciale, retard de crestere si/sau afectare a creierului.

Alte malformatii congenitale asociate cu consumul de bauturi alcoolice in timpul sarcinii includ malformatii ale inimii si rinichilor, deficiente de vorbire si de vedere, buza de iepure, dezvoltarea insuficienta a creierului si disfunctii ale sistemului nervos central.

Anumite studii au sugerat faptul ca un nivel scazut al consumului de alcool in timpul sarcinii nu are niciun efect advers asupra fatului. Cu toate acestea, medicina nu a stabilit care este nivelul sigur de consum de alcool in timpul sarcinii. Consumul de alcool in orice etapa din timpul sarcinii poate afecta dezvoltarea creierului fatului.

Unele studii au relevat faptul ca, consumul excesiv de alcool poate fi asociat cu sterilitatea, in special la femeile cu varste de peste 30 de ani.

Consumul excesiv de alcool din partea tatalui poate, de asemenea, sa contribuie la aparitia de probleme la copii sai, inclusiv malformatii cardiovasculare, o greutate scazuta la nastere si probleme ale sistemului imunitar.

Luati masuri

Inainte de a consuma alcool in timpul sarcinii, consultați medicul dumneavostra sau specialistul pe probleme de sanatate.

desprealcool.ro

este un website dedicat informarii persoanelor pentru a face alegeri in cunostinta de cauza referitoare la alcool

alte website-uri

Aceste website-uri contin informatii suplimentare care va pot fi folositoare. Cu toate acestea, SABMiller nu este raspunzator pentru continutul acestor website-uri.

- European FASD Network <http://www.eufasd.org/>
- Drinking and You – femeile si alcoolul <http://www.drinkingandyou.com/site/us/health/women.htm>
- National Organization on Fetal Alcohol Syndrome - <http://www.nofas.org/>
- NIAAA – Alcohol Alert, fetal alcohol exposure and the brain - <http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/aa50.htm>

- NIAAA, Drinking and Your Pregnancy http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/DrinkingPregnancy_HTML/pregnancy.htm
- The Center For Adoption Medicine, FASD Links - <http://www.adoptmed.org/topics/fetal-alcohol-spectrum-links.html>
- U.S. Center for Disease Control (CDC), Fetal Alcohol Spectrum Disorders - <http://www.cdc.gov/ncbddd/fasd/index.html>

